




Universal Screening for SARS-CoV-2 in Women Admitted for Delivery

[Sutton et al. NEJM, Apr 13 2020](#)



רב היולדות החיוביות ל-SARS-CoV-2 היו אסימפטומטיות

יולדות הן אוכלוסייה ייחודית בגלל שהן באות במגע עם מערכת הבריאות מספר פעמים במהלך ההריון.

בבדיקות סקר שבוצעו בקרב 215 יולדות בני-יורק, נמצא:

- 15% מהנשים היו חיוביות לנגיף.

- רב הנשים החיוביות לנגיף, 13.5% מכלל הנשים, לא הציגו סימפטומים במעמד הבדיקה

- כל הנשים הסימפטומטיות היו חיוביות לנגיף.

- רק 3 יולדות מתוך 29 שהיו חיוביות לנגיף אך לא הציגו סימפטומים בקבלתן פיתחו סימפטומים במהלך אשפוזן, עד ששוחררו לאחר הלידה.

הנתונים אמנם אינם משקפים את המצב בארץ ובמקומות אחרים עם אחוזי הדבקה שונים, אך מתריעים על נוכחות פוטנציאלית סמויה של הנגיף באוכלוסייה ובבית החולים. כידוע, מידע מדויק על נושאי הנגיף הוא חשוב בקבלת החלטות לגבי מדיניות בידוד והתנהלות זהירה של הצוות המטפל.